

# 化学療法指示箋（処方箋） FOLFIRI+ザルトラップ

無菌処理料

0.22ミクロン以下のインラインフィルター使用

シユアフューザー使用

調製日

調製者

|      |      |                |       |       |       |    |
|------|------|----------------|-------|-------|-------|----|
|      |      |                | 疾患名   | 大腸がん  | 実施場所  | 外来 |
| 患者名  |      |                | 前回投与日 |       | 医師自署  |    |
| 身長   |      | cm             | 投与予定日 |       | 受付看護師 |    |
| 体重   |      | kg             | 1クール  | 2週間   | 受付薬剤師 |    |
| 体表面積 | 0.00 | m <sup>2</sup> | CVポート | あり・なし | 薬局監査  |    |

《注射》

| 薬剤名   | 標準投与量<br>(mg/m <sup>2</sup> ) | 計算値<br>(mg) | 実投与量           | 投与時間      | 確認印    |
|---|-------------------------------|-------------|----------------|-----------|--------|
| <b>(CVポートの場合)</b>                               |                               |             |                |           |        |
| ①生食シリンジ 20mL                                    |                               |             | 1本             | カテーテル確認など |        |
| ②グラニセトロンバッグ100mL<br>プロイメンド (150)<br>デカドロン (6.6) |                               |             | 1袋<br>1V<br>1V | 30分       |        |
| ③テルモ生食 100mL<br>ザルトラップ<br>※標準投与量の単位は、mg/kg      | 4                             | 0           | 1本<br>mg       | 60分       |        |
| ④大塚5%ブドウ糖液 250mL<br>レボホリナート                     | 200                           | 0           | 1本<br>mg       | 120分      | ⑤と同時に  |
| ⑤大塚生理食塩液 250mL<br>カンプト                          | 150                           | 0           | 1本<br>mg       | 90分       | ④と同時に  |
| ⑥テルモ生食 100mL<br>5-FU                            | 400                           | 0           | 1本<br>mg       | 全開で       | ④⑤終了時に |
| <b>(シユアフューザー-使用の場合)</b>                         |                               |             |                |           |        |
| ⑦生食シリンジ 20mL                                    |                               |             | 1本             | ウォッシュアウト  |        |
| ⑧生理食塩水<br>5-FU                                  | 2400                          | 0           | mL<br>mg       | 46時間      |        |
| ⑨生食シリンジ 20mL                                    |                               |             | 1本             | ウォッシュアウト  |        |
| <b>(CVポートの場合)</b>                               |                               |             |                |           |        |
| ⑩ヘパリンロック 10mL                                   |                               |             | 1本             | 注入し抜針     |        |

《内服》 外来で施行時は院外処方箋を発行

| 薬剤名          | 標準投与量 | 計算値 | 1回投与量 | 用法  | 投与期間         | 確認印 |
|--------------|-------|-----|-------|-----|--------------|-----|
| デカドロン錠 (0.5) |       |     | 8T    | 朝食後 | 3日間<br>2~4日目 |     |
|              |       |     | 8T    | 夕食後 |              |     |