

# 化学療法指示箋（処方箋） XELOX+アバスチン

無菌処理料

調製日                      調製者

		疾患名	大腸がん	実施場所	外来
患者名		前回投与日		医師自署	
身長	cm	投与予定日		受付看護師	
体重	kg	1クール	3週間	受付薬剤師	
体表面積	0.00 m <sup>2</sup>	CV <sup>ポ</sup> ート	あり・なし	薬局監査	

≪注射≫

薬剤名	標準投与量 (mg/m <sup>2</sup> )	計算値 (mg)	実投与量	投与時間	確認印
(CVポートの場合)					
①生食シリンジ 20mL			1本	カテーテル確認など	
②グラニセトロンバッグ プロイメンド (150) デカドロン(6.6)			1袋 1V 1V	30分	
③テルモ生食 100mL アバスチン <small>※標準投与量の単位は、mg/kg</small>	7.5	0	1本 <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> mg	30分 <small>(初回投与時は90分) (2回目は60分) (3回目以降は30分)</small>	
④大塚5%糖注 250mL			1本	120分	
⑤エルプラット	130	0	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> mg		
⑤生食シリンジ 20mL			1本	ウォッシュアウト用	
(CVポートの場合)					
⑥ペパリンロック 10mL			1本	注入し抜針	

≪内服≫ 外来で施行時は院外処方箋を発行

薬剤名	標準投与量 (mg/m <sup>2</sup> /day)	計算値 (mg)	1回投与量	用法	投与期間	確認印
ゼローダ	2000	0	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> mg	朝食後	14日間 1日目夕～	
			<input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> mg	夕食後		
デカドロン (0.5)			8 T	朝食後	3日間 2～4日目	
			8 T	夕食後		