

# 化学療法指示箋（処方箋） GEM+TS-1 day 1

無菌処理料

調製日

調製者

		疾患名	胆道がん	実施場所	外来
氏名		前回投与日		医師自署	
身長	cm	投与予定日		受付看護師	
体重	kg	1クール	2投1休	受付薬剤師	
体表面積	0.00 m <sup>2</sup>	CVポ <sup>レ</sup> ト	あり・なし	薬局監査	

《注射》

薬剤名	標準投与量 (mg/m <sup>2</sup> )	計算値 (mg)	実投与量	投与時間	確認印
①生食シリンジ 20mL			1本	カテーテル確認など	
②グラニセトロンバッグ デカドロン (6.6mg)			1袋 1V	30分	
③5%ブドウ糖液 100mL ゲムシタビン注	1000	0	1本 <input type="text"/> mg	30分	
④生食シリンジ 20mL			1本	ウォッシュアウト用	
(CVポートの場合)					
⑤ヘパリンロック 10mL			1本	注入して抜針	

《内服》 外来で施行時は院外処方箋を発行

薬剤名	標準投与量 (mg/m <sup>2</sup> )	計算値 (mg)	1回投与量 (mg)	用法	投与期間	確認印
ティーエスワン Cap	60	0	<input type="text"/> mg	朝食後	14日間 Day 1夕 開始	
			<input type="text"/> mg	夕食後		

化学療法指示箋（処方箋） GEM+TS-1 day 8

無菌処理料

調製日

調製者

		疾患名	胆道がん	実施場所	外来
氏名		前回投与日		医師自署	
身長	cm	投与予定日		受付看護師	
体重	kg	1クール	2投1休	受付薬剤師	
体表面積	0.00 m <sup>2</sup>	CVポート	あり・なし	薬局監査	

《注射》

薬剤名	標準投与量 (mg/m <sup>2</sup> )	計算値 (mg)	実投与量	投与時間	確認印
①生食シリンジ 20mL			1本	カテーテル確認など	
②グラニセトロンバッグ デカドロン (6.6mg)			1袋 1V	30分	
③5%ブドウ糖液 100mL ゲムシタビン注	1000	0	1本 mg	30分	
④生食シリンジ 20mL (CVポートの場合)			1本	ウォッシュアウト用	
⑤ヘパリンロック 10mL			1本	注入して抜針	